



DESCUBRE INNOVACIÓN. SI LA ROYA SE APROXIMA, PREVENLA CON APROACH PRIMA®

Aproach Prima®

FUNGICIDA

Aproach Prima® es un fungicida de amplio espectro para el control foliar de enfermedades con acción preventiva, curativa y sistémica.

Con el poder biocinético superior de Aproach Prima® y su gran residualidad logrará un mayor control, llegando rápidamente hasta el último rincón de la planta, protegiéndola totalmente del ataque de los hongos.

¿ QUÉ ES APPROACH PRIMA®?

Approach Prima® es el fungicida de Corteva Agriscience™ que posee la máxima efectividad y un gran poder residual gracias a la combinación de la **Estrobilurina** más moderna del mercado con Triazol.

Cuenta con propiedades de uso agrícola, sistémicas, ya que es transportado en forma translamina y acropétala dentro de las hojas de las plantas tratadas y posee un amplio efecto residual.

BENEFICIOS



COMPORTAMIENTO EN LA PLANTA

- Approach Prima® se absorbe rápidamente tras la aplicación.
- **Tiempo estimado:** menos de 2 horas.
- Rápida movilización en el sistema vascular del cereal.
- Hasta un 40% penetra en el interior de los tejidos.
- Buena resistencia al lavado por lluvia o riego.




MEJOR CONTROL

Approach Prima® es un producto de características biocinéticas superiores y con todas las ventajas de un nuevo concepto en fungicidas.



Cuando se utiliza la tecnología Approach Prima® de Corteva Agriscience™ se obtiene un cultivo más sano y verde por más tiempo, dando como resultado un mayor peso y calidad de los granos y consecuentemente una mayor productividad.



CARACTERÍSTICAS BIOCINÉTICAS ÚNICAS

- Inhibidor de la biosíntesis del esteroles.
- Disruptor de la función de las membranas.
- Inhibidor de la biosíntesis ergosterol.
- Control preventivo y curativo.
- Grupo C3 (F.R.A.C.*).

*F.R.A.C. – Fungicide Resistance Action Committee.

RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | ENFERMEDADES | DOSIS (mL/ha) | ÉPOCA DE APLICACIÓN |
|---|---|---------------|--|
| Trigo , Avena, Cebada, Centeno, Triticale (35)* | Roya de la hoja (<i>Puccinia triticina</i>) | 250 – 400 | Foliar: Aplique el producto cuando aparezcan los primeros síntomas o tan pronto las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilice un volumen de agua aproximado de 400 L/ha. |

*() Intervalo de Seguridad = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: No entre ni permita la entrada de otras personas a las áreas tratadas durante un intervalo de 24 horas después de la aplicación.



Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com



Registro Sanitario: RSCO-MEZC-FUNG-1301V-0295-026-25

Banda Precautoria: Verde

Categoría toxicológica: 5

Titular del registro: DuPont Mexicana, S. de R.L. de C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.