

“USO AGRÍCOLA”

Lapisa 
AGRÍCOLA



Tiabendazol
Fungicida Agrícola / Polvo Humectable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
Ingrediente activo:	60.0
Tiabendazol:	
2-(tiazol-4-il) bencimidazol (Equivalente a 600 g de i.a./kg a 20 °C)	
Ingredientes inertes:	40.0
Agente humectante, Dispersantes, Diluyente	
Total	100.0
Registro: RSCO-FUNG-0399-0254-002-60	



“Nocivo si se inhala”

Titular del registro, Formulado y Distribuido por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel.: 01(352) 526 13 00.

www.lapisa.com

HECHO EN CHINA Y/O EN MEXICO

PRECAUCIÓN

“ ESTE MATERIAL NO ES UNA ETIQUETA, LA FUNCION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER ILUSTRATIVO.”

“ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno.

Manténgase almacenado en un lugar seguro.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de contacto con la piel o la boca, lávese inmediatamente.

Retire al sujeto del área contaminada.

Remueva la ropa contaminada y lave las partes expuestas con abundante agua. Si ocurre vómito voltear al sujeto sobre el costado y asegurar que respire sin dificultad.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo Químico: Benzimidazol.

Antídoto: En caso de ingestión del producto, deberá efectuarse un lavado gástrico. Lavar la boca con buches de agua y administrar carbón activado mezclado con agua (1 g por kg de peso). No se administre leche o cualquier cosa que contenga grasa.

Signos y síntomas de intoxicación: En caso de ingerirse o de inhalarse puede presentar efectos colaterales gastrointestinales, efectos transitorios de náuseas, vómito, debilidad, somnolencia, vértigo y dolor de cabeza.

Tratamiento: Use tratamiento sintomático.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.



“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS/ha
Papa (0)	Costra negra de la papa <i>Rhizoctonia solani</i>	2-3 kg Aplicación a la semilla al fondo del surco, y dos aplicaciones “in drench” a los 60 y 90 días después de la emergencia.
Lima Limón Mandarina Naranja Tangerina Toronja	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)	0.5- 0.7 kg/ ha Realizar dos aplicaciones al follaje con un intervalo de 14 días , con un volumen de 620 a 720 L de agua por ha.
Calabaza Calabacita Chayote Melón Pepino Sandía	Pudrición radical (<i>Phyitium sp.</i> , <i>Sclerotina sp.</i> , <i>Rhizoctonia sp.</i> , <i>Fusarium sp.</i> y/o <i>Verticillum sp.</i>)	2.0- 3.0 kg/ha Realizar 1 aplicación en drench de 10 a 20 días después de la emergencia de la planta. Volumen de aplicación de agua 800 L/ha, 15 mL de la solución por planta.
Fresa Zarzamora	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	1.5- 2.0 kg/Ha Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días con un volumen de agua de 260 a 360 L/ ha.
Papayo	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)	1.0- 2.0 g/ L de agua Realizar dos aplicaciones al follaje y/o al banco de la fruta con intervalo de 7 días, con un volumen de agua de 530 a 630 L de agua/ ha.
Aguacate (15)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)	0.75- 1.5 kg Realizar dos aplicaciones foliares dirigidas al follaje y fruto con intervalo de 7 días entre cada una.

() Intervalo de seguridad en días, entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:
 NO ENTRE AL ÁREA TRATADA ANTES DE LAS 12 HRS.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra cuidadosamente la bolsa utilizando su mascarilla.

Calibre el equipo de aplicación, en un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar el producto a la dosis recomendada en esta etiqueta y agitar, posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo y agregar la totalidad del agua calculada en la calibración. Se recomienda mantener en agitación.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35° C.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados si es aplicado a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

Este producto, no deberá mezclarse con otros productos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

