

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
<b>TIPO DE AGROINSUMO:</b> Herbicida			
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> SELECT® ULTRA			
<b>FORMULACIÓN:</b> Concentrado emulsionable	<b>pH DE LA FORMULACIÓN:</b> 4.6 (emulsión al 1%)	<b>COLOR:</b> Ámbar claro	<b>SOLUBILIDAD EN GUA:</b> Emulsificable
<b>COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO</b>		<b>PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:</b> Clethodim	
<b>Ingrediente activo</b> Clethodim: (5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3-cloroaliloxiimino]propil]-5-[(2RS)-2-(etiltilio)propil]-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona ..... 12.5 (Equivalente a 118 g de i.a./litro)		<b>FAMILIA QUÍMICA:</b> Ciclohexanodionas	
<b>Ingredientes inertes</b> Solvente y emulsificantes ..... 87.5 Total: ..... 100.0		<b>FORMULA QUÍMICA:</b> C <sub>17</sub> H <sub>26</sub> ClNO <sub>3</sub> S	
<b>MODO DE ACCIÓN:</b> SELECT® ULTRA es un herbicida de aplicación en post-emergencia al cultivo y a la maleza formulado como concentrado emulsionable, para utilizar en el control selectivo de las malezas gramíneas en cultivos de hoja ancha. El ingrediente activo de SELECT® ULTRA es un inhibidor de los ácidos grasos esenciales para la integridad de las membranas celulares vegetales.			
<b>CATEGORÍA DE PELIGRO:</b> 5 PRECAUCIÓN	<b>RESIDUALIDAD:</b> Ligeramente	<b>NÚMERO DE REGISTRO:</b> RSCO-HEDE-0270-306-009-013	
<b>USOS AUTORIZADOS:</b>			
CULTIVOS	MALEZA	DOSIS litros/ha	RECOMENDACIONES
Agave (0)	Zacate ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ), Zacate de agua, ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Zacate burro ( <i>Paspalum sp.</i> )	1.5	Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza cuando esta tenga entre 5 y 15 cm. de altura y en no más de 250 litros de agua/ha.
Alfalfa (15)	Zacate kikuyo ( <i>Pennisetum clandestinum</i> )	2.0 a 2.5	Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza. Use no más de 250 litros de agua/ha.
	Zacate grama <i>Cynodon dactylon</i> )	1.0 a 2.5	
	Raigras criollo ( <i>Lolium multiflorum</i> ), Cebadilla ( <i>Bromus catharticus</i> ), Zacate mosquita ( <i>Eragrostis mexicana</i> )	1.5 a 2.0	
Algodonero (65)	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	0.75 a 1.0	Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza y en no más de 250 litros de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate de cáscara (20)	Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Zacate liendrilla ( <i>Leptochloa filiformis</i> ), Sorgo voluntario ( <i>Sorghum vulgare</i> )	1.0 a 1.5	Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza. Use no más de 250 litros de agua/ha.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor, Colza, Mostaza (30)	Zacate navajita ( <i>Bouteloua sp.</i> ), Zacate pitillo ( <i>Ixophorus unisetus</i> ), Zacate de agua ( <i>Leptochloa sp.</i> ), Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	1.5	Realice una aplicación en post-emergencia dirigida al cultivo y a la maleza, cuando ésta última tenga entre 5 y 15 cm de altura, usando un volumen de aplicación de 370 a 470 litros de agua/ha.
Cacahuete (40)	Zacate grama ( <i>Cynodon dactylon</i> )	1.0 a 1.5	Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza.
Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía (14)	Zacate kikuyo ( <i>Pennisetum clandestinum</i> ), Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	1.0 a 1.5	Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza.
Cebollín (14)	Avena ( <i>Avena fatua</i> ), Trigo ( <i>Triticum aestivum</i> ), Alpiste ( <i>Phalaris minor</i> ), Zacate de Agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	0.5 a 1.5	Aplique cuando la maleza no sobrepase más de 8 a 10 cm. de altura y el suelo tenga humedad. Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza en no más de 300 litros de agua/ha.
Frijol, Chícharo, Garbanzo, Lenteja, soya (30)	Zacate grama ( <i>Cynodon dactylon</i> )	2.0 a 2.5	Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza. Use no más de 250 litros de agua/ha.
	Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Zacate plumilla ( <i>Leptochloa filiformis</i> ) Zacate pitillo ( <i>Ixophorus unisetus</i> ) Zacate pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> )	1.0-1.5	
	Zacate cola de Zorra ( <i>Setaria verticillata</i> ), Cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> )	2.0	
Tabaco (20)	Zacate de agua ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Zacate liendrilla ( <i>Leptochloa filiformis</i> ) Sorgo voluntario ( <i>Sorghum vulgare</i> )	1.0 a 1.5	Aplique en forma post-emergente al cultivo y a la maleza. Cuando la maleza tenga de 4 a 6 hojas y un máximo de 20 cm altura. Úselo no más de 250 litros de agua/ha.
Palma de Aceite o Africana (8)	Maleza Gramínea ( <i>Paspalum fasciculatum</i> ) ( <i>Paspalum virgatum</i> )	1.0	Realice 1 aplicación en pos-emergencia a la maleza y el cultivo el volumen sugerido de aplicación es de 300 litros de agua/ha, sin embargo, se recomienda realizar una calibración previa para determinar el volumen correcto de agua.
Fresa, Arándano, Frambuesa, Grosella, Mora, zarzamora (30)	Zacate kikuyo ( <i>Pennisetum clandestinum</i> ), Zacate grama ( <i>Cynodon dactylon</i> ), Cebadilla ( <i>Bromus carinatus</i> ), Raigras criollo ( <i>Lolium multiflorum</i> ), Zacate horquetilla ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ), Zacate mosquita ( <i>Eragrostis mexicana</i> )	2.0	Realice la aplicación foliar en post-emergencia a la maleza y cultivo. Inicie las aplicaciones cuando la maleza tenga de 10 a 20 cm de altura.
( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.			
<b>Tiempo de reentrada:</b> 48 horas después de la aplicación del producto.			
<b>RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:</b> Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	<b>PRESENTACIONES COMERCIALES:</b> Envase de 500 ml	<b>RESPONSABLE DEL PRODUCTO:</b> Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.	