



EL TITÁN CONTRA LA MALEZA

TordonXT™ 472

HERBICIDA

Herbicida para maíz con un ingrediente activo de última generación y un mejor control contra la maleza de hoja ancha.

TordonXT™472 es un producto muy activo en el combate de las malezas de hoja ancha en maíz, incluyendo aquellas consideradas de difícil control. El efecto de su aplicación se observa en pocas horas, debido a su fórmula exclusiva que contiene **aminopyralid**. Este es un ingrediente activo que actúa rápidamente en la maleza, llegando hasta la raíz y eliminándola en poco tiempo.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Maíz (30)	Chayotillo (<i>Sycios angulatus</i>)	1.0 – 1.5 L/ha	Aplicar en mezcla de tanque con la misma dosis de producto formulado (atrazina 500 SC o 90 WG) procurando que la maleza tenga una altura menor a 15 cm y que el maíz tenga menos de 8 hojas.
	Gigantón (<i>Tithonia tubiformis</i>) Fresadilla (<i>Aldama dentata</i>) Golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Quesillo (<i>Anoda cristata</i>) Gusanillo (<i>Acalipha setosa</i>)	1.0 – 1.5 L/ha	
	Aceitilla (<i>Bidens olerata</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Quesillo (<i>Malva parviflora</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>)	1.5 – 2.0 L/ha	Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo.
	Nabo silvestre (<i>Brassica campestris</i>) Agritos (<i>Oxalis latifolia</i>)		Aplicar cuando la maleza tenga menos de 15 cm de altura y el cultivo no tenga más de 8 hojas.
	Rábano silvestre (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Tomatillo pegajoso (<i>Physalis foetens</i>) Tomatillo (<i>Physalis philadelphica</i>)	1.0 – 2.0 L/ha	
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>)		
	Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>)	1.0 L/ha	* Recomendaciones específicas.
	Correhuela perenne (<i>Convolvulus arvensis</i>)		** Recomendaciones específicas.

*** Recomendaciones específicas:** realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, cultivo 12-15 cm de altura y maleza menor a 8; volumen de aplicación 200-300 L agua/Ha. Úsese en mezcla de tanque con topamazone (porcentaje en peso 29.73%, equivalente en g.i.a./L 336, suspensión concentrada) a una dosis de 100 mL para controlar las siguientes especies de hojas angostas (zacates): Zacate pata de ganso (*Eleusine multiflora*), Zacate horquetilla (*Brachiaria plantaginea*), Zacate liendrilla (*Eragrostis mexicana*), Zacate cola de zorra (*Setaria geniculata*).

**** Recomendaciones específicas:** realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, cultivo 12-15 cm de altura y maleza menor a 8; volumen de aplicación 200-300 L agua/Ha. Úsese en mezcla de tanque con nicosulfuron (porcentaje en peso 4.4%, equivalente en g.i.a./L 40 suspensión concentrada) a una dosis de 1.0 L/Ha para controlar las siguientes especies de hojas angostas (zacates): Zacate pata de ganso (*Eleusine multiflora*), Zacate horquetilla (*Brachiaria plantaginea*), Zacate liendrilla (*Eragrostis mexicana*), Zacate cola de zorra (*Setaria geniculata*). Una dosis de 1.0 L/ha aplíquese sobre maleza con una altura menor a 15 cm y que el maíz tenga menos de 8 hojas.

Periodo de reentrada al área tratada: 24 horas. () Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Los herbicidas que actúan como reguladores de crecimiento, como es **TordonXT™472**, **deben aplicarse en maíz cuando éste tiene entre 2-8 hojas** para evitar que entre en contacto con el punto de crecimiento del cultivo de maíz. Además, el control de la maleza debe realizarse de manera oportuna, para evitar la competencia y daños al cultivo de maíz.



Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto, lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Nombre del producto: TordonXT™472

No. De Registro: RSCO-MEZC-HEDE-1256-0620-315-21.29

Categoría toxicológica: 5 Banda: Verde

BENEFICIOS ÚNICOS DE TordonXT™472

- Elimina la maleza de hoja ancha rápidamente, quitando la competencia al cultivo de maíz.
- Es un producto que no daña el cultivo de maíz, utilízalo en el momento de aplicación recomendado.
- **TordonXT™472** es muy conveniente, ya que combina la acción de amplio espectro incluyendo las malezas difíciles con un costo muy atractivo.
- El ingrediente activo (**aminopyralid**) es de última generación, esto es, producto activo sobre la maleza y amigable con la naturaleza.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
- Use equipo de seguridad o ropa apropiada para aplicar agroquímicos.
- Enjuague tres veces el envase para aprovechar totalmente el producto y no reutilice el envase, destrúyalo.
- Evite utilizar en terrenos que posteriormente se sembrarán con hortalizas, evite el arrastre a cultivos susceptibles como frijol, frutales, alfalfa. Consulte a un técnico para más información.
- Utilizar un volumen de agua suficiente para cubrir la maleza, puede ser de 200 a 300 L/ha.
- Recomendamos el uso de boquillas de abanico plano de los números 8002, 8003.
- No realizar más de una aplicación de **TordonXT™472** por ciclo de cultivo en el caso de maíz.