



HURACAN FLOW®

Herbicida agrícola

Suspensión concentrada

Producto registrado: RSCO-HEDE-0221-0309-064-50.08

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDEINTE ACTIVO:	
DIURON: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (Equivalente a 533 g i.a./L a 20 °C)	44.49
HEXAZINONA: 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,3,5-triazina-2,4(1H,3H)-diona (Equivalente a 67 g i.a./L a 20 °C)	5.59
INGREDIENTES INERTES: Dispersantes, humectantes, anticongelante, antiespumante, cosolvente, diluyente, impurezas y compuestos relacionados	49.92
TOTAL	100.00



NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO.
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

HURACAN FLOW® es un herbicida que actúa por translocación para el control post-emergente de las malezas de hoja ancha y angosta, mencionadas en el cuadro de recomendaciones, en el cultivo de caña de azúcar (*Saccharum officinarum*).

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (30)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Hierba de pollo (<i>Commelina sp.</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Zacate gramma (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>)	2.0-4.0	Realizar una aplicación dirigida a la maleza, volumen de aplicación 400-500 L de agua/ha.

*(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

**LMR (Límite Máximo de Residuos):**

CULTIVO	DIURON (mg/kg)	HEXAZINONA (mg/kg)
Caña de azúcar	0.2 (EPA*)	0.6 (EPA)

*Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Para abrir el envase, es importante vestir el equipo de protección adecuado, agítese bien antes de usar, gire la tapa y abra con cuidado el envase, procurando no entrar en contacto directo con el producto. Llenar el tanque de agua a $\frac{3}{4}$ de su capacidad, mida con una probeta de plástico la cantidad de producto a usar y agregue al tanque; agite constantemente y agregue el resto de agua.

CONTRAINDICACIONES

Por la actividad residual de **HURACAN FLOW®** el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación. No aplique **HURACAN FLOW®** en horas de calor intenso, ni cuando el viento exceda los 15 km/hr.

HURACAN FLOW® posee un efecto residual en campo de aproximadamente 60-90 días, por lo que si hay rotación de cultivo a otro diferente al de caña de azúcar, no deberá establecerse en dicho periodo a fin de evitar efectos fitotóxicos.

FITOTOXICIDAD

HURACAN FLOW® no es fitotóxico al cultivo aquí señalado, si se aplica en apego a las recomendaciones establecidas en esta etiqueta. Debido a que constantemente se liberan nuevas variedades de caña de azúcar es recomendable hacer una prueba previa para asegurar que no se presente una reacción fitotóxica en la variedad específica que usted cultive.

INCOMPATIBILIDAD

HURACAN FLOW® No debe mezclarse con otros productos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.