

FICHA TÉCNICA KOA EXTRA WG



NOMBRE COMERCIAL: KOA EXTRA WG

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS

53.3% p/p

DIURON:

3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea
(Equivalente a 533 g/Kg)

HEXAZINONA:

3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,3,5-triazina-2,4 (1H,3H)-diona
(Equivalente a 67 g/Kg)

6.7% p/p

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, humectante, estabilizante y relleno

40.0% p/p

FAMILIA O GRUPO QUIMICO:

KOA EXTRA WG, contiene dos ingredientes activos: diuron y hexazinona. El diuron pertenece al grupo de las ureas sustituidas, mejor conocido como grupo químico de la fenilamida. La hexazinona pertenece al grupo químico de las triazinas (triazinonas).

REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-MEZC-1222-0668-343-60

TIPO DEFORMULACION: Gránulos dispersables en agua

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO:

Gránulos color blanco, pH: 6-9, olor suave.

MODO DE ACCIÓN DE KOA EXTRA WG:

KOA EXTRA WG es una mezcla de dos ingredientes activos: Diuron y Hexazinona.

El Diuron es un herbicida sistémico que es absorbido principalmente por las raíces con traslocación vía xilema. La Hexazinona es un herbicida que actúa por contacto e ingestión y es absorbido por hojas y raíces con traslocación acrópeta. Ambos ingredientes activos de **KOA EXTRA WG** inhiben el transporte de electrones en el fotosistema II.

USOS AUTORIZADOS DE KOA EXTRA WG:

KOA EXTRA WG está autorizado para su aplicación foliar en los cultivos de **caña de azúcar**.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA KOA EXTRA WG



CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

KOA EXTRA WG es un herbicida sistémico, con acción por contacto e ingestión gracias a la combinación de sus dos ingredientes activos: diuron y hexazinona

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Caña de Azúcar (30)	Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y cultivo, volumen de aplicación 410-510 L de agua/ha

() **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:

12 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR KOA EXTRA WG:

Utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES:

KOA EXTRA WG deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD

KOA EXTRA WG no es fitotóxico al cultivo indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta del producto.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA KOA EXTRA WG



INCOMPATIBILIDAD QUIMICA

KOA EXTRA WG no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) en buen estado, limpio y completo: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.

Diuron + Hexazinona

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>